



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

BULLETIN DÉCAIRE D'INFORMATION AGRO-HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE DU GTP



2025, N° 005

23 mai 2025



**Créer de la valeur ajoutée dans les filières
prioritaires du projet pour une sécurité
alimentaire et nutritionnelle durable au Togo**



1. SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

1.1. SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE : PLUIES MODÉRÉES À FORTES

La deuxième décennie du mois de mai a été marquée par des pluies modérées à fortes sur l'ensemble du pays. Les quantités recueillies sont comprises entre 16,0 mm à Blitta en trois (03) jours et 199,5 mm à Guérin Kouka en quatre (4) jours.

L'analyse de la figure 1 ci-dessous montre que les zones les plus arrosées sont situées dans

les régions de la Kara, des Plateaux et Maritime.

Par rapport à la normale 1991-2020, un déficit pluviométrique a été observé sur l'ensemble du pays à l'exception de l'Est des Plateaux et de la Maritime (Fig. 2).

Dans ce numéro :

Situation météorologique	1
Situation hydrologique	2
Situation agricole	2
Production végétale	2
Production animale	3
Production halieutique	4
Convert végétal	4




Fig. 1 : Carte de cumul de pluie de la décennie




Fig. 2 : Carte de l'anomalie de la décennie

Perspectives: Au cours de la prochaine décennie, des manifestations pluvio-orageuses modérées à fortes sont attendues avec quelques coups de vent sur l'ensemble du pays.

1.2. SITUATION AGROMÉTÉOROLOGIQUE

Les conditions météorologiques de la décennie ont été dans l'ensemble relativement propices aux activités agricoles.

Au Nord, les activités de préparation des sols (labours, confession des buttes) se poursuivent avec le démarrage par endroits des semis des cultures telles que le coton, le sorgho, le maïs, l'arachide et le gombo.

Au Sud, l'entretien des cultures est en cours (désherbage, épandage d'engrais, traitement phytosanitaire). Le maïs est en phase de floraison dans certaines localités.

AVIS ET CONSEILS 1 :

Dans le nord du pays, il est conseillé de poursuivre la préparation des parcelles et de s'approvisionner en intrants de qualité en attendant le démarrage effectif de la saison.

Pour la zone bimodale (Sud Togo), il est recommandé de s'approvisionner en engrais et en produits phytosanitaires de qualité déjà disponibles dans les magasins de la CAGIA et des structures agréées ; d'éviter l'occupation incontrôlée des zones inondables ; de veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer des aménagements hydro-agricoles et de suivre au quotidien les prévisions de l'ANAMET.

Faits saillants

- Disponibilité des semences agricoles certifiées ;
- Contacts des inspecteurs de semences ;
- 84 053,300 tonnes d'engrais disponibles ;
- Production chalutière, production piscicole, repos biologique, état océanique agité, gilet de sauvetage obligatoire ;
- Mauvaise condition du couvert végétal sur la majeure partie du pays.

2. SITUATION HYDROLOGIQUE

Les valeurs définies dans le tableau 1 indiquent que les hauteurs maximales varient de 170 à 140 cm à Kpédji et de 104 à 113 cm à Kolokopé.

On note une baisse de niveau d'eau moyenne décadaire dans les bassins fluviaux du Mono à la station de Kolokopé (de 114,5 à 106,8 cm) et dans le bassin du Zio à la station de Kpédji (de 68,6 à 55,8 cm) par rapport aux décades précédentes.

L'analyse des courbes décadaires actuelles (a et b) montre un pic du niveau d'eau de 140 cm environ au 4ème jour à Kpédji et un pic atteignant une valeur d'environ 115 cm au 7ème jour à la station de Kolokopé.

Dans l'ensemble on observe une baisse du niveau d'eau dans les deux bassins fluviaux.

Tableau 1 : Hauteurs moyennes et maximales

Stations	Hauteur Maximale (cm)		Hauteur moyenne (cm)	
	Décade précédente	Décade actuelle	Décade précédente	Décade actuelle
KPEDJI (Zio)	170	140	114,5	106,8
KOLOKOPE (Mono)	104	113	68,6	55,8




Fig. 3 : Courbes de variation des hauteurs d'eau à Kpédji (a) et à Kolokopé (b)

Source: DRE, mai 2025

3. SITUATION AGRICOLE

3.1 PRODUCTION VEGETALE

Pour la campagne agricole 2025-2026, les engrais vivriers sont disponibles. A la date du 23 mai 2025, le stock physique national des engrais minéraux disponibles est de **84 053,300 tonnes** dont **32 635,600 tonnes** de NPK 15-15-15 et **51 417,700 tonnes** d'UREE 46%N (Fig. 4).




Fig. 4 : Stock d'engrais disponible au 23/05/2025

3.2 PROTECTION DES CULTURES

LA LUTTE CONTRE LES JASSIDES

Les jassides sont des petits insectes qui s'attaquent aux cultures. Se nourrissant par des piqures au niveau des nervures des feuilles (gombo, coton, canne à sucre), les jassides provoquent des jaunissements des bords du limbe (souvent accompagnés d'un enroulement vers le bas) qui par la suite s'étendent à tout le limbe pendant que les bords rougissent. La feuille finit enfin par se dessécher. Ces symptômes sont souvent confondus aux maladies.

Lutte chimique :

Utilisez une dose de 100g/ha de Flonicamide 500g/kg (JAZZFIRE 500 GW) à l'apparition des symptômes.



Fig. 5 : Jasside sur une feuille




Fig. 6 : Dégâts de la Jasside sur le plant du gombo (a, b) et sur le cotonnier (c)

3.3 PRIX DES SEMENCES CERTIFIEES (Campagne agricole 2025-2026)

Les prix des semences certifiées sont fixés à l'issue d'une réunion qui a regroupé le 21 février 2025, les acteurs des filières riz, maïs, soja, ainsi que les représentants des structures telles que l'Institut de conseil et d'appui technique (ICAT), la Direction de la production agricole (DPA) et la Coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles (CTOP).

Les prix des semences pour l'année 2025 sont présentés dans le tableau 2. Veuillez-vous adresser aux inspecteurs des semences pour tout achat (Tableau 3).

Tableau 2 : Prix officiel des semences certifiées au
Kilogramme

Tableau 3 : Liste des inspecteurs de semences

CULTURES	PRIX AU KG (F CFA)
Maïs	650
Riz	550
Sorgho	650
Fonio	600
Sésame	3 000
Niébé	1 000
Soja	700
Arachide en gousse	800

N°	NOM	PRÉNOMS	CONTACT	PRÉFECTURE
1	ABONZA	Kokou	90422179	Ogou
2	AMEGBO	Kosi Alozi	92409426	Binah
3	ASSASSE	Komla	70457132	Tchaoudjo
4	ATIAGAMA	Kokou	98089228	Tandjoaré
5	BADOUTCHIA	Aklesso	92145455	Amou
6	BAKONA	Batobakou	93713879	Tone
7	DABLA	Nassoma Nawa-nou	90241249	Agou
8	DJAGNY	Kokouvi Mawulolo	93381855	Kéran
9	FIAKLI	Koffi Seyram	90766163	Ogou
10	MOZINO	Paderem Naka	90323838	Sotouboua
11	TOLA	Lambana Emma-nuel	91863901	Zio
12	YOVOGAN	Komi Seyram	90834416	Zio

Source: DPA, 2025

Source: DPA, 2025

3.4 PRODUCTION ANIMALE : Contrôle du flux d'animaux sur le marché à bétail d'Adétikopé au 1er trimestre 2025

Le marché à bétail d'Adétikopé est l'un des principaux centres de commerce de bétail au Togo, situé dans la commune d'Agoè-Nyivé 6, au Nord de Lomé. Il s'étend sur une superficie de 2 hectares environ et peut accueillir plusieurs centaines de bovins (Photo 1).

Dans le cadre du contrôle des flux de bovins au cours du 1^{er} trimestre 2025, un effectif de 5 830 têtes de bovins a été enregistré à l'entrée du marché contre 5 988 têtes durant la même période de l'année dernière soit une baisse de 2,64%. A la sortie du marché vers les différents points d'abattage ou autres destinations, 6 672 têtes ont été dénombrées contre 7 018 têtes au 1^{er} trimestre 2024 soit une baisse de 4,93% (Tableau 4). Cette baisse pourrait être liée, entre autre, à la crise sécuritaire dans le Sahel et ses répercussions dans la région des Savanes. Les prix des bovins sub-adultes ou adultes ont varié en moyenne entre 220 000 et 675 000 FCFA durant cette période.

Tableau 4 : Flux de bovins sur pieds au marché à bétail d'Adétikopé

Période	Entrée		Sortie	
	2024	2025	2024	2025
Janvier	2 017	1 975	2 465	2 293
Février	1 805	1 845	2 126	2 160
Mars	2 166	2 010	2 427	2 219
Total	5 988	5 830	7 018	6 672

Source: DE, avril 2025



Photo 1: Bovins sur pieds au marché à bétail d'Adétikopé

3.5 PRODUCTION HALIEUTIQUE

Pour cette décade la production halieutique se résume à la production chalutière qui correspond au débarquement de **2,525 tonnes** provenant d'un chalutier et à la production piscicole de tilapia de **35,382 tonnes**.

Tableau 5 : Données de production piscicole pour la période du 13 au 18 mai

Période	Production halieutique	Quantité (tonne)
13 au 18 mai 2025	Production chalutière	2,525
	Production piscicole	35,382

Source: DPA, mai 2025

AVIS ET CONSEILS 2:

Dans la perspective de renouvellement du stock halieutique, il sera instauré cette année un repos biologique en mer et sur le système lagunaire au Togo conformément à l'arrête N° 0007/2025/MRHART/MEMPC/SG/DPA du 10 avril 2025, portant instauration du repos biologique en mer et sur le système lagunaire .

Les périodes annuelles d'interdiction de la pêche sont fixées comme suit :

- * du 1^{er} juillet au 31 août inclus pour la pêche chalutière et industrielle en mer ;
- * du 1^{er} au 31 juillet inclus pour la pêche artisanale se déroulant en mer ou sur le système lagunaire.

L'état océanique prévu pour les 23, 24 et 25 mai 2025 est agité. Ainsi, il est rappelé à toute la communauté de la pêche artisanale maritime de respecter les drapeaux d'annonciation

des prévisions de l'état océanique avant toute sortie en mer.

Pour rappel le rouge interdit toute sortie, le jaune la prudence et le vert l'autorisation. Tous les usagers marins de la pêche opérant en mer doivent être prudents et prendre des mesures idoines de sécurité et se munir tous de leurs gilets de sauvetages avant toute sortie en mer conformément à l'arrêté N°0006/2025/MRHART/SG/DPA du 10 avril 2025, portant obligation d'embarquement et de port du gilet de sauvetage à bord des embarcations et navires de pêche dans les eaux sous juridiction togolaise .

Aussi les pêcheurs du port de pêche sont tenus de déclarer tous les membres d'équipages aussi bien à la sortie qu'au retour de leur campagne de pêche aux gardes côtes présents à quai.

4. COUVERT VEGETAL

L'Indice des conditions de végétation (VCI – Vegetation Condition Index) évalue l'état de santé de la végétation par rapport aux tendances historiques. Le VCI rapporte l'indice NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) de la décade courante à son minimum et son maximum à long terme, normalisé au moyen des valeurs historiques du NDVI pour la même décade.

La situation végétale au cours de cette deuxième décade de mai a été caractérisée par une mauvaise condition de la végétation dans presque toutes les préfectures de la région des Savanes, Kara, Centrale et Maritime. Cependant, l'Est de la région de la Kara (Kéran, Doufelgou, Kozah) et toute la région des Plateaux présentent une bonne condition de la végétation au cours de cette décade, à l'exception de l'Est-mono et Haho (Fig.7a).

Comparée à la même décade de l'année 2024, on note une dégradation du couvert végétal dans toutes les régions (Fig. 7b).




Fig. 7 : indice de condition de la végétation (VCI)

Source : Système mondiale d'information et d'alerte rapide (SMIAR)

Retrouvez-nous sur le
www.agriculture.gouv.tg/FSRP Togo



« Créer de la valeur ajoutée dans les filières prioritaires du projet pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Togo »