



Juin 2026

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

RESUME

Le mois de juin a été pluvieux sur l'ensemble du pays avec des quantités de pluies faibles à fortes. Ces pluies ont été, par endroits, favorables aux activités agricoles et au développement des cultures. Elles ont été globalement excédentaires sur tout le pays par rapport à la normale 1991-2020. Les températures ont été supérieures à la normale durant les trois décades. L'humidité relative moyenne décadaire a varié entre 73 et 94 %. La vitesse du vent à 2 m du sol est comprise entre 0,4 et 2,3 m/s. Les activités agricoles ont porté essentiellement sur la mise en place et l'entretien des cultures.

Sommaire

1. SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

- 1.1. Situation pluviométrique
- 1.2. Températures
- 1.3. Humidité relative
- 1.4. Vent

2. SITUATION AGROMÉTÉOROLOGIQUE

3. PERSPECTIVES



1. SITUATION METEOROLOGIQUE

L'état synoptique moyen des paramètres météorologiques du mois de juin est présenté dans les trois tableaux suivants

Tableau n° 1 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 1er au 10 juin

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	Umoy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	100,6	5	28,4	82,5	2,3
Tabligbo	86,5	4	29,0	80,2	0,4
Kouma-Konda	97,3	8	24,7	87,3	0,6
Atakpamé	205,8	5	27,3	79,1	1,5
Sokodé	68,2	5	28,1	90,9	1,2
Kara	78,4	5	28,4	79,4	1,0
Niamtougou	87,6	6	27,2	77,3	1,9
Mango	40,0	3	29,5	77,1	0,4
Dapaong	83,2	4	28,9	75,9	1,6
Mandouri	37,4	3	30,1	74,3	1,8
Anié Mono	93,2	5	28,8	77,1	0,9
Notsè	157,8	5	28,4	79,5	1,6
Blitta	231,9	5	28,5	74,2	1,1
Sotouboua	117,1	4	28,4	73,2	1,3
Pagouda	92,2	6	28,1	83,5	1,7
Kpalimé Tové	171,1	7	28,0	79,9	0,7
Guérin Kouka	**	**	28,0	85,0	**
Tindjassée	71,1	5	28,1	79,5	1,3
Kantè	39,7	4	28,4	76,7	0,8
Danyi	**	**	24,2	83,1	0,5
Tsévié	**	**	28,3	79,7	1,0
Elavagnon	93,0	6	28,1	78,7	1,1
Bassar	96,8	7	27,4	77,4	1,5
Kpédji	89,0	5	**	**	**

Source : ANAMET 2026

Tableau n° 2 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 11 au 20 juin

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	87,4	3	27,7	83,7	1,9
Tabligbo	56,1	3	28,4	80,8	0,4
Kouma-Konda	6,7	4	24,2	88,4	0,6
Atakpamé	35,7	2	26,8	79,4	1,5
Sokodé	53,0	6	26,7	92,8	0,7
Kara	13,3	2	27,9	77,3	1,0
Niamtougou	63,2	4	26,0	80,7	1,7
Mango	75,4	3	28,3	81,5	0,4
Dapaong	64,9	3	27,2	80,1	1,2
Mandouri	48,7	3	28,2	84,1	1,7
Anié Mono	64,2	3	28,2	78,2	0,9
Notsè	3,2	2	28,2	79,5	1,6
Blitta	63,3	5	27,2	79,0	1,0
Sotouboua	40,7	4	26,9	76,8	1,0
Pagouda	22,8	3	27,5	84,5	1,3
Kpalimé Tové	30,1	2	27,8	80,1	0,7
Guérin Kouka	44,2	3	26,9	88,3	**
Tindjassée	51,6	4	27,2	82,7	1,2
Kantè	24,2	4	27,0	80,0	0,7
Danyi	7,5	1	23,8	82,9	0,7
Tsévié	0,0	0	27,7	80,8	0,8
Elavagnon	29,1	3	27,5	79,4	1,0
Bassar	46,1	5	27,3	78,3	1,3
Kpédji	24,0	1	**	**	**

Source : ANAMET, 2026

Tableau n° 3 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 21 au 30 juin

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	233,2	8	26,6	84,6	2,0
Tabligbo	117,0	6	27,3	83,2	0,4
Kouma-Konda	48,0	6	23,5	89,8	0,6
Atakpamé	18,4	1	26,3	81,7	1,6
Sokodé	44,8	2	26,6	93,9	0,7
Kara	26,6	2	27,5	76,9	0,8
Niamtougou	54,4	4	26,1	79,3	1,7
Mango	3,8	2	28,6	80,7	0,4
Dapaong	8,2	2	27,7	79,1	1,0
Mandouri	10,5	1	28,3	83,2	2,0
Anié Mono	13,4	2	27,6	79,2	1,0
Notsè	22,0	3	27,4	79,7	1,9
Blitta	49,0	3	27,2	78,8	1,0
Sotouboua	34,4	3	26,5	77,7	1,1
Pagouda	37,4	2	27,2	76,9	1,3
Kpalimé Tové	79,2	6	26,9	83,0	0,6
Guérin Kouka	10,5	2	27,1	84,1	1,7
Tindjassée	0,0	0	27,1	81,3	1,1
Kantè	58,1	3	27,2	79,6	0,7
Danyi	48,3	6	23,2	85,3	0,5
Tsévié	0,0	0	26,6	84,2	0,9
Elavagnon	27,0	2	27,1	81,1	1,2
Bassar	28,8	4	26,8	79,1	1,3
Kpédji	165,7	5	**	**	**

Source : ANAMET, 2026

Légende

- Tmoy (°C) : Température moyenne en degré Celsius
- Umoy (%) : Humidité relative moyenne en pourcentage
- Nb : Nombre
- Jrs : Jours
- ** : Données manquantes

1.1 Situation pluviométrique

Les planches n°1, 2 et 3 représentent les cumuls et les anomalies pluviométriques décadaires des stations synoptiques.

- Situation pluviométrique de la première décade




Planche n°1: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 1ère décade (b)
Source : ANAMET, 2026

Au cours de la première décade du mois de juin, l'ensemble du pays a été arrosé par des pluies modérées à fortes. Les hauteurs ont oscillé entre 34,7 mm à Mandouri en trois (03) jours et 231,9 mm en cinq (05) jours à Blitta. L'analyse de la planche n° 1a montre que les zones les plus arrosées se retrouvent dans les Plateaux et la Centrale. Par contre, la région des Savanes a enregistré de faibles quantités de pluie. Par rapport à la normale (Planche n° 1b), tout le pays a connu un excédent pluviométrique.

- Situation pluviométrique de la deuxième décade




Planche n°2: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 2ème décade (b)
Source : ANAMET, 2026

La deuxième décade a été marquée par des pluies faibles à fortes dans toutes les régions du pays. Les cumuls enregistrés varient de 3,2 mm à Notsè en deux (02) jours à 87,4 mm à Lomé en trois (03) jours. La planche n° 2a indique que les zones les plus arrosées sont situées dans les régions Maritime, Centrale et Savanes. Comparés à la normale, un excédent pluviométrique a été constaté dans toutes les régions à l'exception des zones Sud de la Kara, de l'Ouest des Plateaux et du Nord-ouest de la Maritime (Planche n° 2b).

- Situation pluviométrique de la troisième décade




Planche n°3: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 3ème décade (b)
Source : ANAMET, 2026

L'analyse de la planche n° 3a révèle que la troisième décade a été caractérisée par des pluies faibles à fortes sur l'ensemble du territoire. Les quantités d'eau recueillies ont oscillé entre 3,8 mm à Mango en deux (02) jours et 233,2 mm à Lomé en huit (08) jours. La région Maritime a été la zone la plus arrosée avec des cumuls dépassant 100 mm. Par contre, la région des Savanes a enregistré les faibles quantités de pluies.

Par rapport à la normale (Planche n° 3b), un déficit pluviométrique a été observé dans toutes les régions à l'exception de la Maritime et la zone Sud des Plateaux où on note un excédent.

1.2 Températures

Les planches n° 4, 5 et 6 donnent l'évolution comparative de la température moyenne et de la normale dans les différentes stations.

- Evolution des moyennes thermiques de la première décade




Planche n°4: Température moyenne (a) et anomalie de la 1ère décade (b)
Source : ANAMET, 2026

Les températures moyennes sous abri ont varié de 24,2 °C (Danyi) à 30,1 °C (Mandouri). L'analyse de la planche n° 4a montre que la région des Savanes a enregistré les températures les plus élevées. Par rapport à la normale, elles sont en hausses dans toutes les régions (Planche n° 4b).

- Evolution des moyennes thermiques de la deuxième décennie




Planche n° 5 : Température moyenne (a) et anomalie de la 2ème décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Les températures moyennes ont oscillé entre 23,8 °C à Danyi et 28,4 °C à Tabligbo. Les régions des Savanes et Maritime ont été les zones les plus chaudes (Planche n° 5 et Tableau n° 2).

L'ensemble du pays a enregistré une hausse hormis la région des Savanes où la température est en baisse comparativement à la normale (Planche n° 5b).

1.3. Humidité relative

L'humidité relative maximale de l'air a été relevée à Sokodé au cours des trois décades avec respectivement 91, 93 et 94 %. La minimale a été observée à Sotouboua durant la première et la deuxième décennie (73 et 77 %) ; à Kara et Pagouda (77 %) pour le compte de la troisième décennie (Tableau 1, 2 et 3).

1.4. Vent

Au cours des trois décades, la vitesse maximale du vent à 2 m du sol a été observée à Lomé avec respectivement 2,3 ; 1,9 et 2,0 m/s. La minimale a été relevée à Tabligbo et à Mango avec 0,4 m/s pour les trois décades (Tableaux n° 1, 2 et 3).

2. SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

Dans la zone monomodale, les activités de préparations du sol sont bien avancées et se poursuivent activement. Les principaux semis concernent le maïs, le soja, le niébé, le sorgho, l'arachide et le riz. La première fertilisation a été réalisée dans la plupart des localités à l'exception de quelques-unes (semis tardifs). La répartition inégale des pluies a entraîné des séquences sèches qui conduisent à une mauvaise levée des cultures, nécessitant des opérations de ré-semis de certaines parcelles. On observe également par endroits un début de jaunissement et de dessèchement des plants issus des premiers semis.

Dans la zone bimodale, les cultures mises en place par endroits sont principalement le soja, la patate douce, le niébé, le maïs etc. Les fortes pluies enregistrées surtout au cours de la troisième décennie ont occasionné localement des inondations de parcelles ou a rendu difficile les activités d'entretien (le sarclage, le désherbage, l'apport de fertilisants) et la destruction des infrastructures. Toutefois, la récolte d'arachides, du maïs frais et du gombo se poursuivent dans certaines localités.

3. PERSPECTIVES

Le mois de juillet sera marqué par des pluies localisées dans le sud pouvant entraîner une fin précoce de la grande saison agricole comme prévu. Le reste du pays observera des activités pluvio-orageuses modérées avec des coups de vent localisés. Le traitement phytosanitaire des cultures et la récolte du maïs par endroits dans la zone bimodale seront les activités des producteurs. Dans la zone monomodale, la mise en place et l'entretien des cultures constitueront les principales activités agricoles.

CONCLUSION

Le mois de juin a enregistré des pluies faibles à fortes avec une répartition qui a relativement favorisé les activités agricoles sur l'ensemble du pays. Ces activités sont caractérisées par la mise en place des cultures et leur entretien dans la zone monomodale et le traitement phytosanitaire dans la zone bimodale. Les températures sont en hausse par rapport à la normale. Des coups de vent par endroits ont été observés surtout pendant des manifestations pluvio-orageuses entraînant la verse dans certaines localités.

EQUIPE SCIENTIFIQUE :

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. AGNIGA K.Tchaa, Chef division agrométéorologie;
Mme EGBARE Awadi Mewékiwé, Ingénieur en agrométéorologie ;
M. BADABI Essossinam, Technicien supérieur en agrométéorologie.

Production: Agence Nationale de la Météorologie ,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390/91267138