



Juillet 2026

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

RESUME

Le mois de juillet 2026 a été caractérisé par des pluies faibles à fortes sur l'ensemble du territoire. Ces pluies ont été, par endroits, favorables aux activités agricoles et au développement des cultures. Comparées à la normale 1991-2020, elles ont été déficitaires durant la première et la troisième décade. Les températures ont connu une hausse par rapport à la normale durant les trois décades. L'humidité relative moyenne a varié entre 74 et 94 %. La vitesse du vent à 2 m du sol a oscillé entre 0,3 et 2,5 m/s. Les activités agricoles ayant occupé les producteurs ont porté essentiellement sur la mise en place des cultures et le traitement phytosanitaire dans la zone monomodale. L'entretien des cultures et la récolte ont été les activités principales dans la zone bimodale.

Sommaire

1. SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

- 1.1. Situation pluviométrique
- 1.2. Températures
- 1.3. Humidité relative
- 1.4. Vent

2. SITUATION AGROMÉTÉOROLOGIQUE

3. PERSPECTIVES



1. SITUATION METEOROLOGIQUE

L'état synoptique moyen des paramètres météorologiques du mois de juillet est présenté dans les trois tableaux suivants :

Tableau n° 1 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 1er au 10 juillet

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	Umoy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	13,9	3	27,2	83,7	2,5
Tabligbo	43,3	2	27,9	81,0	0,7
Kouma-Konda	16,8	5	24,1	91,1	0,4
Atakpamé	64,3	2	26,7	81,7	1,6
Sokodé	70,4	5	27,1	93,3	0,8
Kara	77,3	5	27,7	78,1	0,7
Niamtougou	27,8	4	26,3	80,8	1,9
Mango	6,4	2	28,9	80,6	0,4
Dapaong	36,6	3	28,2	79,4	1,7
Mandouri	17,5	3	29,1	78,7	2,5
Anié Mono	125,6	3	28,4	78,9	1,0
Notsè	24,4	2	28,1	78,8	2,2
Blitta	38,5	3	27,9	78,2	1,2
Sotouboua	30,0	3	27,2	76,9	1,2
Pagouda	139,3	5	27,0	80,7	1,4
Kpalimé Tové	36,3	3	27,8	83,6	0,7
Guérin Kouka	48,9	4	27,5	82,1	1,6
Tindjassée	**	**	**	**	**
Kantè	57,9	5	27,6	80,0	0,8
Danyi	31,0	7	23,6	90,0	0,4
Tsévié	**	**	27,4	82,6	1,3
Elavagnon	40,2	4	27,7	81,0	1,1
Bassar	86,5	6	26,9	80,6	1,4
Kpédji	0,0	0	**	**	**

Source : ANAMET 2026

Tableau n° 2 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 11 au 20 juillet

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	22,9	3	26,5	84,9	2,3
Tabligbo	13,5	3	27,3	81,3	0,7
Kouma-Konda	80,2	6	22,9	92,4	0,4
Atakpamé	112,0	3	25,6	84,0	1,6
Sokodé	96,4	8	26,0	93,4	0,7
Kara	203,4	8	26,7	81,0	1,0
Niamtougou	59,0	7	25,6	83,4	1,9
Mango	37,4	5	28,7	80,1	0,4
Dapaong	102,2	5	26,9	83,2	1,5
Mandouri	106,9	3	29,0	77,1	2,2
Anié Mono	87,1	3	27,1	82,2	1,0
Notsè	72,9	4	26,7	82,4	2,2
Blitta	68,3	6	26,6	81,6	0,9
Sotouboua	175,7	8	25,8	81,1	1,4
Pagouda	91,9	7	26,4	82,3	1,4
Kpalimé Tové	61,8	4	26,0	85,5	0,7
Guérin Kouka	60,0	6	26,7	84,0	1,6
Tindjassée	**	**	**	**	**
Kantè	42,2	4	27,1	81,7	0,7
Danyi	60,4	6	22,3	93,2	0,4
Tsévié	**	**	26,8	82,8	1,1
Elavagnon	120,0	5	26,5	84,5	1,0
Bassar	81,7	4	26,1	82,7	1,4
Kpédji	43,1	4	**	**	**

Source : ANAMET, 2026

Tableau n° 3 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 21 au 31 juillet

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	1,7	1	26,1	85,6	2,4
Tabligbo	1,8	1	26,9	74,0	0,8
Kouma-Konda	82,5	6	23,1	92,6	0,3
Atakpamé	48,9	4	26,0	84,0	1,6
Sokodé	60,3	3	26,5	91,3	1,0
Kara	96,8	6	27,5	79,0	0,9
Niamtougou	109,4	4	26,0	81,4	2,0
Mango	92,7	3	28,0	82,2	0,4
Dapaong	92,9	5	26,6	84,0	1,4
Mandouri	65,2	4	27,8	83,9	1,9
Anié Mono	67,1	6	27,4	82,6	1,0
Notsè	19,8	2	27,1	81,6	2,5
Blitta	25,4	3	27,6	78,3	0,9
Sotouboua	68,5	3	26,5	79,5	1,3
Pagouda	143,8	6	26,8	81,8	1,3
Kpalimé Tové	38,9	6	26,1	83,9	0,7
Guérin Kouka	52,8	4	27,1	82,5	1,6
Tindjassée	**	**	**	**	**
Kantè	62,2	5	27,1	81,9	0,7
Danyi	1,0	1	22,7	93,6	0,4
Tsévié	**	**	26,1	84,3	1,3
Elavagnon	24,2	5	27,2	82,6	1,3
Bassar	52,9	4	26,6	81,7	1,6
Kpédji	11,2	3	**	**	**

Source : ANAMET, 2026

Légende

- Tmoy (°C) : Température moyenne en degré Celsius
- Umoy (%) : Humidité relative moyenne en pourcentage
- Nb : Nombre
- Jrs : Jours
- ** : Données manquantes

1.1 Situation pluviométrique

Les planches n°1, 2 et 3 représentent les cumuls et les anomalies pluviométriques décennales des stations synoptiques.

- Situation pluviométrique de la première décennie




Planche n°1 : Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 1ère décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Au cours de la première décennie du mois de juillet, l'ensemble du pays a été arrosé par des pluies faibles à fortes. Ces pluies ont varié entre 6,4 mm à Mango en deux (02) jours et 139,3 mm en cinq (05) jours à Pagouda. Les zones les plus arrosées se localisent dans les régions de la Kara, de la Centrale et des Plateaux comme l'indique la planche n° 1a. Par contre, l'Ouest de la Maritime a recueilli les faibles quantités de pluie. Par rapport à la normale (Planche n° 1b), l'Est des Plateaux et de la Centrale ainsi qu'une partie de la Kara ont observé un excédent pluviométrique. La situation est déficitaire partout ailleurs.

- Situation pluviométrique de la deuxième décennie




Planche n°2 : Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 2ème décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

A la deuxième décennie, des pluies orageuses modérées à fortes ont été observées sur l'ensemble du territoire à l'exception de la région Maritime où des pluies faibles ont été enregistrées suite à la présence précoce de la mousson. Les cumuls ont varié entre 13,5 mm à Tabligbo en trois (03) jours et 203,4 mm à Kara en huit (08) jours. L'analyse de la planche n° 2a montre que les zones les plus arrosées se retrouvent dans les régions de la Kara et Centrale. Comparée à la normale, un excédent pluviométrique se dégage dans toutes les régions hormis la Maritime, les zones Sud des Plateaux et des Savanes où la situation est déficitaire (Planche n° 2b).

- Situation pluviométrique de la troisième décennie




Planche n°3 : Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 3ème décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Durant la troisième décennie, des activités pluvio-orageuses modérées à fortes ont été enregistrées sur l'ensemble du territoire hormis la Maritime où des pluies faibles ont été observées suite à l'intensification de la mousson. Les quantités d'eau recueillies vont de 1,7 mm à Lomé en un (01) jour à 143,8 mm à Pagouda en six (06) jours. La majeure partie des Savanes et l'Est de la Kara ont été les zones les plus arrosées comme l'indique la planche n° 3a. Un excédent pluviométrique se dégage dans les régions des Savanes et de la Kara ; en revanche, un déficit est observé sur le reste du pays comparativement à la normale (Planche n° 3b).

1.2 Températures

Les planches n° 4, 5 et 6 donnent l'évolution comparative de la température moyenne et de la normale dans les différentes stations synoptiques.

- Evolution des moyennes thermiques de la première décennie




Planche n°4 : Température moyenne (a) et anomalie de la 1ère décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Sous abri, les températures moyennes ont varié entre 23,6 °C (Danyi) et 29,1 °C (Mandouri). La région des Savanes a été la zone la plus chaude (Tableau n° 1, Planche n° 4a). Par rapport à la normale, elles sont en hausse dans toutes les régions (Planche n° 4b).

Evolution des moyennes thermiques de la deuxième décennie




Planche n° 5 : Température moyenne (a) et anomalie de la 2ème décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Les températures moyennes ont oscillé entre 22,3 °C à Danyi et 29,0 °C à Mandouri (Tableau n° 2). Les Savanes ont enregistré les températures les plus élevées comme l'indique la planche n° 5a. Par rapport à la normale, on note une hausse de la température sur l'ensemble du pays (Planche n° 5b).

Evolution des moyennes thermiques de la troisième décennie




Planche n° 6 : Température moyenne (a) et anomalie de la 3ème décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

La température moyenne de la troisième décennie a évolué de 22,7 °C (Danyi) à 28,0 °C (Mango). Tout comme les deux premières décades, les Savanes restent la zone la plus chaude (Tableau n° 3 et planche n° 6a). L'analyse de la planche n° 6b montre qu'elle est en hausse par rapport à la normale dans toutes les régions hormis le Sud-ouest de la Maritime où elle est en légère baisse.

1.3. Humidité relative

Suivant les tableaux n°1, 2 et 3, l'humidité relative maximale de l'air a été relevée à Sokodé (93 %) au cours des deux premières décades et à Danyi (94 %) durant la dernière décennie. La minimale a été observée à Sotouboua (77 %) durant la première décennie, à Mandouri (77 %) au cours de la deuxième et à Tabligbo (74%) pour le compte de la troisième décennie.

1.4. Vent

La vitesse moyenne minimale du vent à 2 m du sol (0,4 m/s) a été observée à Kouma Konda, à Mango ainsi qu'à Danyi pour la première et la deuxième décennie ; à Kouma Konda (0,3 m/s) pour le compte de la troisième décennie. La moyenne maximale a été relevée à Lomé au cours des deux premières décades avec respectivement 2,5 et 2,3 m/s et à Notsé (2,5 m/s) durant la troisième décennie (tableaux n° 1, 2 et 3).

2. SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

Au Nord (régions des Savanes, de la Kara et la Centrale), les travaux agricoles se poursuivent activement avec les opérations d'entretien (sarclage, billonnage) et de fertilisation. Les activités de semis tendent vers la fin avec quelques rares semis (maïs, arachide, soja, sorgho, riz et sésame). Cependant, la pause pluviométrique enregistrée dans certaines localités a entraîné le retard de croissance des cultures rendant ainsi difficile l'épandage des engrais avec une prolifération d'attaques de chenilles légionnaires d'automne (CLA). Par ailleurs, les récoltes du maïs frais, d'arachide et de niébé précoce sont effectuées.

Au Sud (régions des Plateaux et Maritime), se poursuivent les activités de mise en place des cultures du soja, du riz, du gombo, du coton, du piment et de la tomate. Les entretiens culturaux de certaines parcelles de maïs mises en place tardivement continuent. La récolte du maïs, d'igname, d'arachide, de la tomate et du piment est constatée dans presque toutes les préfectures.

3. PERSPECTIVES

Le mois d'août sera marqué par des activités pluvieuses faibles et intermittentes dans la Maritime. Des perturbations pluvio-orageuses modérées sont prévues dans les autres régions du pays.

La poursuite de l'entretien et du traitement phytosanitaire des cultures en plein développement seront les activités dans la zone nord. Les cultures seront dans la phase floraison-maturation. Les semis du niébé et du soja vont préoccuper les producteurs dans la même zone. Par contre, la récolte, le séchage et la préparation des parcelles pour la deuxième saison agricole constitueront les activités des producteurs de la zone sud.

CONCLUSION

Le mois de juillet a enregistré des pluies faibles à fortes qui ont favorisé les activités agricoles sur presque l'ensemble du pays. Ces dernières sont caractérisées par la mise en place des cultures dans la zone nord et le traitement phytosanitaire dans la zone sud. Les températures sont en hausse par rapport à la normale. Des coups de vent par endroits ont été observés surtout pendant des manifestations pluvio-orageuses.

EQUIPE SCIENTIFIQUE :

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. AGNIGA K.Tcha, Chef division agrométéorologie;
M. KPABEBA Laoukossima, Ingénieur en agrométéorologie ;
M. BOUKARI Razakou, Technicien supérieur en agrométéorologie.

Production: Agence Nationale de la Météorologie ,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390/91267138