



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

BULLETIN DÉCAIRE D'INFORMATION AGRO-HYDRO-MÉTÉOROLOGIQUE DU GTP



2026, N° 017

23 sept 2026



Créer de la valeur ajoutée dans les filières prioritaires du projet pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Togo

1. SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

1.1. SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE

Des activités pluvio-orageuses ont été observées sur l'ensemble du territoire durant la deuxième décade du mois de septembre. Les quantités de pluie recueillies ont varié de 1,0 mm à Lomé en un (01) jour à 168,4 mm en six (06) jours à Pagouda. L'analyse de la figure 1 montre que les régions des Savanes, de la Kara et la Centrale constituent les zones les plus

arrosées. Par contre, les Plateaux et la Maritime ont été les zones les moins arrosées.

Par rapport à la normale 1991-2020 (Fig. 2), un déficit pluviométrique se dégage depuis le Sud de la région Centrale jusqu'à la côte et le Nord-ouest des Savanes ; la situation est excédentaire dans le reste du pays.

Dans ce numéro :

Situation météorologique 1

Situation hydrologique 2

Situation agricole 2-4

Dosage d'engrais 4




Fig. 1 : Carte de cumul de pluie de la décade




Fig. 2 : Carte de l'anomalie de la décade

Source : ANAMET, sept 2026

Perspectives : La décade prochaine sera marquée par des activités pluvio-orageuses sur l'ensemble du pays avec un accent dans le Nord.

Faits saillants

- Pluviométrie déficitaire sur la majeure partie du pays ;
- Dépassement des seuils dans tous les bassins ;
- Variétés précoces de riz ;
- 60 828,900 tonnes d'engrais disponibles ;
- Repos biologique sur le lac Nangbeto ;
- Evolution des prix nationaux des produits vivriers ;
- Démarrage tardif de la petite saison agricole dans le Sud Togo ;
- Focus sur le Striga.

1.2. SITUATION AGROMÉTÉOROLOGIQUE

Au Nord (régions des Savanes, Kara et Centrale), les activités agricoles sont marquées par quelques travaux d'entretien et des récoltes (sorgho, maïs, igname, arachide...) qui se poursuivent activement.

Au Sud (régions des Plateaux et Maritime), les travaux de préparation du sol pour le compte de la petite saison se poursuivent. Quelques rares semis effectués lors des premières pluies sont affectés en raison des séquences sèches observées par endroits dans la Maritime.

Rappelons qu'il est prévu un démarrage tardif et une fin précoce de la petite saison agricole avec des séquences sèches longues en début de saison.

AVIS ET CONSEILS 1 :

Compte tenue des conditions climatiques actuelles et prévues, il est conseillé de :

- ◆ anticiper sur la préparation des sols et semer dès les premières pluies utiles ;
- ◆ utiliser les variétés de cultures à cycle court, résilientes aux déficits hydriques et à haut rendement ;
- ◆ se procurer des semences certifiées auprès des semenciers et des inspecteurs des semences ;
- ◆ se procurer des produits homologués et porter des équipements de protection pour les traitements phytosanitaires ;
- ◆ s'approvisionner en engrais de qualité disponibles dans les magasins de la CAGIA ;
- ◆ faire le dernier désherbage avant la floraison des cultures ;
- ◆ respecter les dosages indiqués d'engrais et d'insecticides ;
- ◆ entreprendre des traitements phytosanitaires avec les insecticides spécifiques homologués pour lutter contre les ravageurs sur les cultures ;
- ◆ accompagner les récoltes précoces par l'aération et la ventilation pour éviter les pertes ;
- ◆ éviter l'occupation anarchique des zones inondables ;
- ◆ prévoir des canaux de drainage ;
- ◆ suivre les prévisions de l'ANAMET.

Créer de la valeur ajoutée dans les filières prioritaires du projet pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Togo



2. SITUATION HYDROLOGIQUE

La situation hydrologique de la deuxième décennie de septembre 2026 est marquée par une hausse notable sur le bassin du Lac Togo, qui franchit le seuil d'alerte H1, une baisse sur le bassin du Mono qui repasse sous le seuil d'alerte H2, et une légère poursuite de la baisse sur le bassin de l'Oti.

Le **Lac Togo** (station de Kpédji) enregistre une nette progression au cours de cette décennie. La hauteur maximale passe de 232 à 340 cm (soit plus 46,6 %), tandis que la hauteur moyenne augmente de 218,1 à 274 cm (soit plus 25,6 %). La hauteur maximale franchit désormais le seuil d'alerte H1 (300 cm), tout en restant en deçà du seuil H2 (400 cm), traduisant l'entrée de ce bassin en situation de vigilance.

Le **Mono** (station de Kolokopé) enregistre une baisse au cours de cette décennie. La hauteur maximale diminue de 700 à 540 cm (soit moins 22,9 %), repassant ainsi sous le seuil d'alerte H2 (600 cm), tandis que la hauteur moyenne diminue de 429,1 à 343,7 cm (soit moins 19,9 %). Ces deux valeurs demeurent toutefois supérieures au seuil

H1 (300 cm), traduisant une amélioration de la situation tout en maintenant une vigilance sur ce bassin.

L'**Oti** (station de Mango) poursuit sa légère baisse au cours de cette décennie, avec une hauteur maximale passant de 710 à 689 cm (soit moins 3,0 %) et une hauteur moyenne de 700 à 627,3 cm (soit moins 10,4 %). La hauteur maximale demeure au-dessus du seuil d'alerte H1 (500 cm) tout en restant en deçà du seuil H2 (800 cm), confirmant le maintien d'une situation de crue nécessitant une vigilance soutenue.

En résumé, la deuxième décennie de septembre 2026 est marquée par une entrée en vigilance du bassin du Lac Togo qui franchit le seuil d'alerte H1, une amélioration de la situation sur le bassin du Mono qui repasse sous le seuil H2 tout en restant en vigilance, et une légère baisse se poursuivant sur le bassin de l'Oti qui demeure en situation de vigilance. L'ensemble des bassins doit continuer de faire l'objet d'un suivi régulier dans les décennies à venir, avec une attention particulière portée aux bassins du Lac Togo, du Mono et de l'Oti.

Tableau 1 : Hauteurs moyennes et maximales

Stations	Hauteur maximale (cm)		Hauteur seuil (cm)		Hauteur moyenne (cm)	
	Décennie	Décennie	H1	H2	Décennie	Décennie
	Précédente	actuelle			précédente	actuelle
Kpédji (Lac Togo)	232	340	300	400	218,1	274
Kolokopé (Mono)	700	540	300	600	429,1	343,7
Mango (Oti)	710	689	500	800	700	627,3




Fig. 3 : Courbes de variation des hauteurs d'eau

AVIS ET CONSEILS 2 :

Au regard de la situation hydrologique, il est recommandé aux populations riveraines des bassins du Mono et de l'Oti d'observer une vigilance accrue, et d'éviter toute activité aux abords immédiats des cours d'eau (pêche, agriculture, baignade). Pour le bassin du Mono, en cas d'alerte des autorités compétentes en raison du maintien de la hauteur maximale au-dessus du seuil d'alerte H2, se conformer strictement aux consignes de sécurité diffusées par l'Agence nationale de la protection civile (ANPC). Pour le bassin du Lac Togo, la situation stable observée n'appelle pas de mesure particulière et permet de maintenir une vigilance habituelle.

Source : DRE, sept 2026

3. SITUATION AGRICOLE

3.1 GESTION DES INTRANTS

Pour la campagne agricole 2026-2027, les engrais vivriers sont disponibles. A la date du **23 septembre 2026**, le stock physique national des engrais minéraux disponibles est de **60 828,900 tonnes** (Tableau 2) dans les magasins de la Centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles (CAGIA).

Ce stock est réparti comme suit :

- **26 522,000 tonnes** de NPK 15-15-15, soit **13 337,300 tonnes** pour la zone bimodale et **13 184,700 tonnes** pour la zone monomodale ;
- **34 306,900 tonnes** d'UREE 46%N, soit **27 414,450 tonnes** pour la zone bimodale et **6 892,450 tonnes** pour la zone monomodale (Fig.4).




Fig. 4 : stock d'engrais disponible au 23/09/2026

Tableau 2 : Stock national des engrais

TOTAL NATIONAL	TYPE D'ENGRAIS	QUANTITE (T)
	NPK 15-15-15	26 522,000
	UREE 46%N	34 306,900
	TOTAL	60 828,900

Source : CAGIA, 2026

3.2 PRODUCTION HALIEUTIQUE

Pour cette décade, la production halieutique a été de **310,175 tonnes** réparties comme suit :

- * **308,950 tonnes** pour la production artisanale maritime ; et
- * **1,225 tonnes** pour la production industrielle (Tableau 3).

Tableau 3 : Données de la production halieutique

Période	Production halieutique	Quantité (tonne)
14 au 20 sept. 2026	Production artisanale maritime	308,950
	Production industrielle	1,225
	TOTAL	310,175

Source : DPH, sept. 2026

3.3 PROTECTION DES CULTURES

Focus sur le Striga

Le Striga est une plante parasite qui s'attaque à plusieurs cultures notamment le maïs, le sorgho, le mil, la canne à sucre, le niébé, etc. Le Striga, avant même d'émerger du sol, se fixe sur les racines de la plante hôte et lui soutire eau et nutriments (Fig. 5).

Les symptômes visibles sont le jaunissement et le flétrissement des feuilles, le rabougrissement des plants atteints, entraînant une forte réduction des rendements ou même une perte totale en cas de forte infestation. Les facteurs qui favorisent le développement de Striga sont un sol pauvre notamment en azote et la monoculture répétée de cultures sensibles.

La gestion de Striga doit se faire de manière intégrée impliquant des méthodes culturales, des méthodes mécaniques et éventuellement des méthodes chimiques (Méthodes à découvrir dans nos prochains numéros).



Fig. 5 : Striga sur maïs et sorgho

3.4 EVOLUTION DES PRIX NATIONAUX (FCFA/KG) DES PRODUITS VIVRIERS DE JANVIER À AOÛT

L'analyse de la figure 6 montre une variation des prix sur la période de janvier à août. On note une tendance de hausse pour la plupart des produits de janvier à juin. Cette séquence a été suivie d'une baisse au cours de la période juin-juillet, puis d'une stabilisation en août.

Dans ce bulletin, le choix est porté sur le riz local décortiqué et le gari.

Le riz local décortiqué

Le prix du riz local décortiqué reste stable et oscille entre 412 et 425 FCFA/Kg de janvier à mars. Cet prix a connu une nette hausse en avril (479 FCFA/Kg), avant de rechuter

progressivement en mai de 455 FCFA/Kg à 441 FCFA/Kg en août. Sur l'ensemble de la période, le niveau du prix en août reste supérieur à celui de janvier (+29 FCFA/Kg), malgré les fluctuations.

Le gari

Le gari diminue légèrement de 358 FCFA/Kg en janvier à 347 FCFA/Kg en mars, puis amorce une hausse continue jusqu'à 418 FCFA/Kg en juin, avant de retomber fortement à 355 FCFA/Kg en juillet, un niveau quasiment identique à celui de janvier, et de s'y maintenir exactement en août (355 FCFA/Kg). Cette trajectoire en cloche - baisse en début d'année, hausse soutenue d'avril à juin, puis correction rapide et stabilisation en juillet-août - traduit un retournement de tendance à deux reprises sur la période, sans hausse durable installée en fin de période.

Tableau 4 : Evolution des prix moyens (FCFA/KG) des produits agricoles de janvier à août 2026

Produits	Gari	Niébé blanc	Niébé rouge	Riz local décortiqué	Soja	Sorgho rouge	Mais
Janvier	358	474	387	412	303	238	170
Février	353	488	414	423	292	254	168
Mars	347	494	435	425	307	249	167
Avril	379	503	449	479	300	227	172
Mai	411	503	439	455	306	258	180
Juin	418	513	390	459	330	218	171
Juillet	355	493	417	434	340	263	159
Août	355	501	415	441	346	272	158




Fig. 6 : Evolution des prix en FCFA/Kg des denrées alimentaires des produits de base

Source : DPSSE, 2026

3.5 SEMENCES AGRICOLES ET PLANTS

Les prévisions météorologiques de l'ANAMET pour la petite saison des pluies (septembre–novembre 2026) au sud du Togo annoncent une pluviométrie normale à tendance excédentaire, mais avec un démarrage tardif et un risque de fin de saison précoce. Dans ce contexte, il est recommandé aux producteurs d'utiliser des variétés de semences certifiées à cycle court, tolérantes à la sécheresse et à fort potentiel de rendement, afin de limiter les pertes dues à la sécheresse de fin de saison ou aux excès d'eau pour assurer et sécuriser la production de cette petite saison agricole. Les quelques variétés de riz ci-dessous (Tableau 5) sont issues du « catalogue officiel des espèces et variétés végétales du Togo » et ont été proposées en tenant compte de leur précocité, rendement potentiel en grain et d'autres caractéristiques notamment la tolérance à la sécheresse et aux maladies.

Tableau 5 : variétés précoces de riz

N°	Variété	Cycle semis-maturité 50% (jours)	Arome du grain	Écologie de culture	Rendement potentiel (t/ha)	Autres caractéristiques
1	NERICA 11/WAB450- 16-BL2-136- DV1	80-85	Absent	Pluviale	4	Non collant
2	IR64	90-95	Absent	Bas- fond/irriguée	10	Résistance à la sécheresse et aux nuisibles

Source : DPA, sept 2026

3.6 PRINCIPES FONDAMENTAUX POUR LA RÉUSSITE DE L'APPLICATION DES ENGRAIS

Avant toute application d'engrais, il est primordial de tenir compte de l'état du sol (humide et débarrassé des adventices).

Il est conseillé d'apporter localement de la matière organique (compost ou fumier décomposé) lors du labour à une dose d'au moins 1 à 2t/ha par an.

Les 4 principes fondamentaux pour la réussite de l'application des engrais sont :

- * le bon produit (la bonne source) : choisir le type d'engrais adapté aux besoins spécifiques de la culture et du sol (exemple : équilibrer les apports en azote, phosphore et potassium selon le stade de croissance) ;
- * la bonne dose : évaluer précisément la quantité de nutriments requise par la plante pour éviter la sous-fertilisation (perte de rendement) ou la surdose (coûts inutiles et pollution de l'eau) ;
- * le bon moment : appliquer aux périodes où la culture en a réellement besoin pour maximiser l'absorption ;
- * le bon endroit : appliquer à partir de 5 cm à 10 cm du pied en poquet fermé à une profondeur d'au moins 5 cm en allant en fonction du stade de la plante à proximité du système racinaire, jamais contre le collet pour que la plante y accède facilement (pour le cas du maïs).

4. RECOMMANDATIONS DES DOSES D'ENGRAIS DANS LA PREFECTURE DE ZIO

Dans la région Maritime, la préfecture de Zio est caractérisée par des sols ferrugineux tropicaux, ferralitiques et hydromorphes : 30 % des sols sont pauvres en matière organique, 95 % très pauvres en phosphore (P) et 80 % très pauvres en potassium (K).

Tableau 6 : recommandations des doses d'engrais

Cultures	Recommandations anciennes vulgarisées		Nouvelles recommandations			
	Dose	Rendement moyen (t/ha)	A base de NPK 15-15-15 (Sac de 50kg)	A base de NPK 14-18-23* (Sac de 50kg)	Recommandations de dose de matière organique	Rendements ciblés** (t/ha)
Maïs	4 sacs de NPK 15-15-15 2 sacs d'urée	1,5	8 sacs de NPK 1,5 sac d'urée	5 sacs de NPK 2,5 sacs d'urée	1-2 t/ha tous les ans 3-5 t/ha tous les deux (02) ans 7t/ha tous les trois (03) ans	4
Riz	4 sacs de NPK 15-15-15 2 sacs d'urée	2,5	9 sacs de NPK 4,5 sacs d'urée	6 sacs de NPK 0,5 sac de TSP 5 sacs d'urée		6

* nouvelle formule d'engrais à fabriquer

** l'atteinte de ce rendement requiert l'apport de la nouvelle recommandation et le respect de l'itinéraire technique de la culture et la pluviométrie attendue

Source : ITRA, Site Web : <https://fertitogo.tg/fmap>

Retrouvez-nous sur le www.agriculture.gouv.tg/FSRP_Togo



« Créer de la valeur ajoutée dans les filières prioritaires du projet pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Togo »