



Août 2026

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

RESUME

Le mois d'août a été caractérisé par des pluies faibles à fortes sur l'ensemble du territoire. Par rapport à la normale 1991-2020, ces pluies ont été globalement déficitaires au cours des deux premières décades et excédentaires lors de la troisième. Les températures ont connu une tendance haussière durant les trois décades. L'humidité relative moyenne est comprise entre 74 et 94 %. La vitesse du vent à 2 m du sol a évolué de 0,2 à 2,7 m/s. Les activités agricoles se résument essentiellement à l'entretien des cultures dans le Nord et à la préparation des parcelles, aux récoltes, aux séchages et à la conservation des produits agricoles dans le Sud.

Sommaire

1. SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

- 1.1. Situation pluviométrique
- 1.2. Températures
- 1.3. Humidité relative
- 1.4. Vent

2. SITUATION AGROMÉTÉOROLOGIQUE

3. PERSPECTIVES



1. SITUATION METEOROLOGIQUE

La situation des paramètres météorologiques du mois d'août est présentée dans les trois tableaux suivants :

Tableau n° 1 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 1er au 10 août

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	Umoy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	0,0	0	26,3	83,0	2,7
Tabligbo	0,0	0	27,0	77,9	0,7
Kouma-Konda	28,4	2	22,7	91,7	0,5
Atakpamé	37,4	5	25,5	82,9	1,6
Sokodé	90,4	6	25,8	87,9	0,6
Kara	36,5	5	27,1	80,3	1,0
Niamtougou	37,8	5	25,5	83,5	1,9
Mango	92,1	4	27,7	83,0	0,2
Dapaong	189,4	5	26,4	84,7	1,1
Mandouri	84,7	5	27,3	85,4	1,9
Anié Mono	61,1	4	27,1	79,4	1,0
Notsè	0,0	0	26,9	81,0	2,4
Blitta	102,3	6	26,7	81,7	1,0
Sotouboua	67,5	5	25,9	80,1	1,3
Pagouda	148,1	6	26,4	82,8	1,1
Kpalimé Tové	37,9	5	26,1	84,8	0,7
Guérin Kouka	84,2	5	26,8	84,1	1,6
Tindjassée	**	**	**	**	**
Kantè	20,4	5	26,7	82,7	0,7
Danyi	**	**	22,3	93,4	0,4
Tsévié	**	**	26,6	80,1	1,3
Elavagnon	16,3	3	26,8	82,5	1,3
Bassar	52,8	4	26,0	83,2	1,6
Kpédji	0,0	0	**	**	**

Source : ANAMET 2026

Tableau n° 2 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 11 au 20 août

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	0,0	0	26,5	85,0	2,5
Tabligbo	2,0	2	27,5	78,9	0,7
Kouma-Konda	9,1	3	23,3	91,8	0,2
Atakpamé	7,1	2	25,9	84,4	1,3
Sokodé	177,1	4	26,4	86,0	0,6
Kara	99,4	3	27,4	81,0	0,7
Niamtougou	52,8	4	25,9	82,4	1,6
Mango	159,8	7	27,4	83,8	0,2
Dapaong	67,4	5	26,5	84,9	1,0
Mandouri	79,8	4	27,5	84,8	1,4
Anié Mono	9,1	1	27,2	77,0	1,0
Notsè	0,0	0	27,4	80,5	1,9
Blitta	51,8	6	27,4	89,3	0,8
Sotouboua	62,4	6	25,9	79,7	1,2
Pagouda	113,6	7	26,9	83,6	1,0
Kpalimé Tové	46,7	3	26,5	83,6	0,6
Guérin Kouka	61,7	3	26,7	84,8	1,3
Tindjassée	**	**	**	**	**
Kantè	47,0	5	26,7	83,2	0,7
Danyi	**	**	22,7	94,2	0,4
Tsévié	**	**	27,1	79,4	1,3
Elavagnon	14,4	4	26,8	83,6	1,2
Bassar	140,8	7	26,3	83,3	1,2
Kpédji	0,0	0	**	**	**

Source : ANAMET, 2026

Tableau n° 3 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 21 au 31 août

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	0,0	0	27,3	83,4	2,5
Tabligbo	44,3	3	28,3	78,3	0,6
Kouma-Konda	91,4	7	23,9	90,3	0,4
Atakpamé	215,5	7	26,4	83,3	1,4
Sokodé	141,7	4	26,8	84,8	0,7
Kara	143,9	3	28,2	78,9	0,7
Niamtougou	59,8	7	26,8	81,3	1,5
Mango	56,1	6	28,8	81,3	0,9
Dapaong	125,8	6	27,5	84,7	0,8
Mandouri	48,0	6	28,6	82,8	1,2
Anié Mono	102,1	6	27,9	74,2	0,9
Notsè	126,1	4	27,8	81,7	2,0
Blitta	101,0	5	27,6	79,8	0,8
Sotouboua	106,0	5	26,4	78,5	1,3
Pagouda	37,3	6	27,6	81,4	1,1
Kpalimé Tové	84,2	6	27,4	81,8	0,7
Guérin Kouka	103,9	7	27,2	84,2	1,3
Tindjassée	**	**	**	**	**
Kantè	47,0	7	27,5	82,0	0,7
Danyi	**	**	23,3	92,7	0,5
Tsévié	**	**	27,9	77,9	1,2
Elavagnon	65,3	6	27,4	82,7	1,0
Bassar	185,0	9	26,5	83,2	1,3
Kpédji	5,5	2	**	**	**

Source : ANAMET, 2026

Légende

- T moy (°C) : Température moyenne en degré Celsius
- U moy (%) : Humidité relative moyenne en pourcentage
- Nb : Nombre
- Jrs : Jours
- ** : Données manquantes

1.1 Situation pluviométrique

Les planches n° 1, 2 et 3 représentent les cumuls et les anomalies pluviométriques décennales des stations synoptiques.

- Situation pluviométrique de la première décennie




Planche n° 1: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 1ère décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Durant la première décennie, des pluies orageuses modérées à fortes ont été enregistrées dans les trois régions du nord. La région Maritime et le Sud des Plateaux ont observé des pluies faibles. Les cumuls vont de 16,3 mm à Elavagnon en trois (03) jours à 189,4 mm à Dapaong en cinq (05) jours. L'analyse de la planche n° 1a montre que la région des Savanes a été la plus arrosée et la Maritime la moins arrosée. Par rapport à la normale, un déficit pluviométrique se dégage depuis le Sud de la région Centrale jusqu'à la côte et une partie de la Kara (Planche n°1b).

- Situation pluviométrique de la deuxième décennie




Planche n°2: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 2ème décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Au cours de la deuxième décennie, les pluies ont oscillé entre 2,0 mm à Tabligbo en deux (02) jours et 177,1 mm en quatre (04) jours à Sokodé. Les endroits les plus arrosés se localisent dans les régions des Savanes, de la Kara et Centrale. En revanche, la Maritime et les Plateaux (zone bimodale) ont recueilli les faibles quantités de pluies (Planche n° 2a). La zone monomodale a enregistré globalement un excédent pluviométrique et la zone bimodale un déficit comparativement à la normale (Planche n° 2b).

- Situation pluviométrique de la troisième décennie




Planche n°3: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 3ème décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Au cours de la troisième décennie, l'ensemble du territoire a enregistré des activités pluvio-orageuses localisées faibles à fortes. Les pluies recueillies vont de 5,5 mm à Gapé Kpédji en deux (02) jours à 215,5 mm en sept (07) jours à Atakpamé. Les zones les plus arrosées se localisent dans les régions des Plateaux, Centrale, de la Kara et des Savanes. Par contre, la Maritime a enregistré les faibles quantités de pluie (Planche n° 3a). L'analyse de la planche n° 3b montre que toutes les régions ont enregistré un excédent pluviométrique à l'exception de la majeure partie des Savanes, du Nord de la Kara et de l'Ouest de la Maritime où un déficit a été observé.

1.2 Températures

Les planches n° 4, 5 et 6 donnent l'évolution de la température moyenne et l'anomalie dans les principales stations.

- Evolution des moyennes thermiques de la première décennie




Planche n° 4: Température moyenne (a) et anomalie de la 1ère décennie (b)
Source : ANAMET, 2026

Sous abri, les températures moyennes ont varié entre 22,3 °C à Danyi et 27,7 °C à Mango. La région des Savanes a été la zone la plus chaude (Tableau n° 1, Planche n° 4a). Par rapport à la normale, les températures sont en hausse dans toutes les régions (Planche n° 4b).

- Evolution des moyennes thermiques de la deuxième décade




Planche n° 5 : Température moyenne (a) et anomalie de la 2ème décade (b)
Source : ANAMET, 2026

Les températures moyennes ont oscillé entre 22,7 °C à Danyi et 27,5 °C à Mandouri et à Tabligbo (Tableau n° 2). L'analyse de la planche n° 5a révèle que les régions des Savanes et Maritime ont été les zones les plus chaudes. Ces températures moyennes ont connu une hausse sur l'ensemble du pays comparativement à la normale (Planche n° 5b).

1.3. Humidité relative

L'humidité moyenne maximale de l'air a été relevée à Danyi au cours des trois décades avec respectivement 93, 94 et 93 %. Les minimales se retrouvent à Tabligbo au cours de la première décade (78 %) et à Anié-Mono durant les deux dernières décades avec 77 et 74 % (Tableaux n° 1, 2 et 3).

1.4 . Vent

Les vitesses minimales du vent à 2 m du sol ont été mesurées à Danyi (0,4 m/s) pour le compte de la première décade et à Kouma Konda (0,2 et 0,4 m/s) durant les deux dernières décades. Les maximales sont relevées à Lomé avec respectivement 2,7 ; 2,5 et 2,5 m/s (Tableaux n° 1, 2 et 3).

2. SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

Dans le Nord, les entretiens culturaux (traitements phytosanitaires des cultures et épandage des engrais) se poursuivent. Par ailleurs, le maïs est à l'étape de la floraison-maturation dans plusieurs localités ; on note la récolte de nouvelles ignames dans quelques localités.

Au Sud, les producteurs continuent les opérations de récolte et de post-récoltes telles que l'égrenage, le vannage, le triage, le séchage et le stockage des produits de la grande saison agricole. Notons que le sarclage est effectué pour les cultures du coton et du soja. En outre, la préparation des parcelles pour la petite saison est en cours. Selon les prévisions, cette petite saison sera caractérisée par un début tardif et une fin précoce avec des pauses pluviométriques longues à normales en début et courtes à tendance normale vers la fin de saison.

3. PERSPECTIVES

Le mois de septembre sera marqué par des pluies orageuses modérées à fortes par endroits sur l'ensemble du pays. L'entretien des parcelles et la mise en place des cultures pour la petite saison agricole seront les principales activités agricoles dans la zone bimodale.

L'entretien des cultures, les traitements phytosanitaires et la récolte (maïs et igname) seront les activités des producteurs dans la zone monomodale.

CONCLUSION

En août, tout le pays a été arrosé par des pluies faibles à fortes. Cette pluviométrie a permis aux cultures de satisfaire leur besoin en eau par endroits. Les autres paramètres climatiques (le vent, la température et l'humidité relative de l'air) ont été globalement favorables pour les plantes dans la zone monomodale. Dans la zone bimodale, ce mois a été marqué par la petite saison sèche. En outre, on constate la préparation des parcelles pour la deuxième saison agricole.

EQUIPE SCIENTIFIQUE :

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. AGNIGA K.Tchaa , Chef division agrométéorologie;
Mme. EGBARE Awadi Mewekiwé, Ingénieur en agrométéorologie ;
M. BADABI Essossinam, Technicien supérieur en agrométéorologie.

Production: Agence Nationale de la Météorologie ,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390/91267138