



Septembre 2026

BULLETIN AGROMÉTÉOROLOGIQUE

RESUME

Le mois de septembre a été marqué par des pluies faibles à fortes sur l'ensemble du pays. Comparées à la normale 1991-2020, ces pluies ont été déficitaires à la première décennie et localement excédentaires au cours des deux dernières décennies. Les températures sont en hausse par rapport à la normale. L'humidité relative a varié entre 71 et 94 %. La vitesse du vent à 2 m du sol se situe entre 0,3 et 2,6 m/s. La plupart des cultures sont à la phase de croissance active dans la zone sud et à maturité dans le nord du pays. Les activités agricoles se résument essentiellement au semis, à l'entretien des cultures, aux traitements phytosanitaires, aux récoltes et au stockage.

Sommaire

1. SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

- 1.1. Situation pluviométrique
- 1.2. Températures
- 1.3. Humidité relative
- 1.4. Vent

2. SITUATION AGROMÉTÉOROLOGIQUE

3. PERSPECTIVES



1. SITUATION METEOROLOGIQUE

La situation des paramètres météorologiques du mois d'août est présentée dans les trois tableaux suivants :

Tableau n° 1 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 1er au 10 septembre

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	Umoy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	18,1	3	27,3	83,8	2,2
Tabligbo	23,6	3	28,3	78,5	0,4
Kouma-Konda	52,4	6	24,0	88,3	0,4
Atakpamé	51,5	7	26,2	83,1	1,5
Sokodé	19,0	4	26,2	84,5	0,9
Kara	52,9	5	27,6	78,8	0,9
Niamtougou	48,8	6	25,7	80,4	1,6
Mango	34,8	6	28,8	80,5	0,4
Dapaong	28,9	4	27,7	82,4	0,8
Mandouri	20,5	2	28,6	82,8	1,4
Anié Mono	55,0	5	27,5	72,7	0,8
Notsè	111,4	6	27,6	81,4	1,7
Blitta	14,1	8	27,2	80,2	1,0
Sotouboua	46,7	4	25,9	81,5	1,1
Pagouda	101,5	5	26,8	82,5	0,4
Kpalimé Tové	64,1	5	27,8	81,0	0,6
Guérin Kouka	64,6	7	27,2	81,8	1,3
Tindjassée	**	**	**	**	**
Kantè	31,3	6	27,1	80,6	0,7
Danyi	**	**	23,4	90,5	0,5
Tsévié	**	**	28,2	76,9	1,1
Elavagnon	51,5	5	26,7	84,0	1
Bassar	114,9	6	26,3	81,7	1,3
Kpédji	3,9	1	**	**	**
Kpéwa-Alédjo	31,5	3	24,3	85,5	**

Source : ANAMET 2026

Tableau n° 2 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 11 au 20 septembre

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	1,0	1	27,6	82,1	2,6
Tabligbo	22,0	1	28,4	78,0	0,6
Kouma-Konda	32,8	5	24,1	90,9	0,4
Atakpamé	28,0	3	26,4	84,1	1,5
Sokodé	134,9	5	26,3	85,8	0,5
Kara	130,0	6	27,4	80,1	0,5
Niamtougou	83,0	8	26,1	80,4	1,4
Mango	100,3	6	28,1	82,6	0,3
Dapaong	42,9	4	27,0	84,4	0,7
Mandouri	39,8	2	28,5	82,1	1,4
Anié Mono	91,6	5	28,1	70,5	0,8
Notsè	31,1	4	27,8	82,4	1,8
Blitta	69,8	6	27,6	79,6	0,8
Sotouboua	38,2	4	26,1	80,4	**
Pagouda	168,4	7	26,1	83,9	**
Kpalimé Tové	23,5	3	27,6	81,1	0,9
Guérin Kouka	63,5	7	27,2	82,9	1,3
Tindjassée	**	**	**	**	**
Kantè	64,5	8	26,9	82,5	0,7
Danyi	**	**	23,2	93,6	0,4
Tsévié	**	**	28,0	78,2	1,2
Elavagnon	13,1	4	27,6	83,0	1,0
Bassar	116,5	5	26,3	83,0	1,2
Kpédji	31,4	2	**	**	**
Kpéwa-Alédjo	30,5	3	28,3	85,1	1,8

Source : ANAMET, 2026

Tableau n° 3 : Valeurs moyennes des paramètres météorologiques du 21 au 30 septembre

Stations	Pluie (mm)	Nb jrs de pluie	T moy (°C)	U moy (%)	Vent (m/s)
Lomé-Aéro	1,9	1	27,3	82,0	2,6
Tabligbo	16,9	1	28,2	77,7	0,4
Kouma-Konda	57,9	7	23,4	92,0	0,6
Atakpamé	118,3	7	26,2	84,3	1,5
Sokodé	91,7	7	26,1	85,7	0,6
Kara	103,5	9	27,4	81,5	0,6
Niamtougou	98,2	9	25,6	84,4	1,5
Mango	76,2	6	27,7	84,6	0,4
Dapaong	61,7	4	27,0	84,9	0,8
Mandouri	135,1	5	27,9	86,3	1,3
Anié Mono	122,5	4	27,4	84,0	0,4
Notsè	118,9	6	27,6	83,4	1,9
Blitta	139,5	6	27,1	81,2	0,9
Sotouboua	37,1	6	24,4	83,2	1,2
Pagouda	121,8	9	26,1	83,9	
Kpalimé Tové	39,5	6	27,1	82,4	0,8
Guérin Kouka	133,3	8	26,0	84,9	1,3
Tindjassée	**	**	**	**	
Kantè	102,9	7	26,6	84,0	0,6
Danyi	**	**	22,8	94,2	0,4
Tsévié	**	**	27,5	79,2	1,2
Elavagnon	89,2	4	27,0	83,5	1,0
Bassar	147,7	8	26,0	84,3	1,2
Kpédji	60,7	4	**	**	**
Kpéwa-Alédjo	**	**	**	**	**

Source : ANAMET, 2026

Légende

- Tmoy (°C) : Température moyenne en degré Celsius
- Umoy (%) : Humidité relative moyenne en pourcentage
- Nb : Nombre

- Jrs : Jours
- ** : Données manquantes

1.1 Situation pluviométrique

Les planches n° 1, 2 et 3 représentent les cumuls et les anomalies pluviométriques décadaires des stations synoptiques.

- Situation pluviométrique de la première décade




Planche n° 1: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 1ère décade (b)
Source : ANAMET, 2026

La première décade du mois de septembre a été caractérisée par des activités pluvio-orageuses sur toute l'étendue du territoire. Des pluies faibles à fortes ont été enregistrées. Les quantités recueillies sont comprises entre 3,9 mm à Gapé Kpédji en un (01) jour et 114,9 mm à Bassar en six (06) jours. L'analyse de la planche n° 1a montre que les régions des Plateaux et de la Kara ont été les zones les plus arrosées. Par rapport à la normale, tout le pays a connu un déficit pluviométrique (Planche n° 2b).

- Situation pluviométrique de la deuxième décade




Planche n° 2: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 2ème décade (b)
Source : ANAMET, 2026

Durant la deuxième décade, les quantités de pluie recueillies ont varié de 1,0 mm à Lomé en un (01) jour à 168,4 mm en six (06) jours à Pagouda. L'analyse de la planche n° 2a montre que les régions des Savanes, de la Kara et la Centrale constituent les zones les plus arrosées. Par contre, les Plateaux et la Maritime ont été les zones les moins arrosées. Par rapport à la normale (Planche n° 2b), un déficit pluviométrique est observé depuis le Sud de la région Centrale jusqu'à la côte et le Nord-ouest des Savanes ; la situation est excédentaire dans le reste du pays.

- Situation pluviométrique de la troisième décade




Planche n° 3: Cumul pluviométrique (a) et anomalie de la 3ème décade (b)
Source : ANAMET, 2026

Au cours de la troisième décade, les pluies enregistrées ont été de faibles à fortes. Les cumuls pluviométriques ont varié de 1,9 mm à Lomé en un (01) jour à 147,7 mm en huit (08) jours à Bassar. De l'analyse de la planche n° 3a, il ressort que les régions des Savanes, de la Kara, de la Centrale et des Plateaux ont été les zones les plus arrosées. En revanche, la Maritime a été la zone la moins arrosée. Comparée à la normale, un excédent pluviométrique s'est dégagé dans toutes les régions à l'exception de la Maritime, du Sud des Plateaux et d'une partie de la Centrale (Planche n° 3b).

1.2 Températures

Les planches n° 4, 5 et 6 donnent l'évolution de la température moyenne et l'anomalie dans les principales stations.

- Evolution des moyennes thermiques de la première décade




Planche n° 4: Température moyenne (a) et anomalie de la 1ère décade (b)
Source : ANAMET, 2026

La situation thermique de la première décade montre que les moyennes de température ont évolué de 23,4 °C (Danyi) à 28,8 °C (Mango). L'analyse de la Planche n° 4a indique que les régions des Savanes et Maritime ont été les zones les plus chaudes. Par rapport à la normale, toutes les villes ont connu une hausse de température excepté Niamtougou (Planche n° 4b).

Evolution des moyennes thermiques de la deuxième décade




Planche n° 5 : Température moyenne (a) et anomalie de la 2ème décade (b)
Source : ANAMET, 2026

Durant la deuxième décade, les régions des Savanes et Maritime ont observé les moyennes de température les plus élevées comme le montre la planche n° 5a. Les valeurs extrêmes ont été relevées à Danyi (23,2 °C) et à Mandouri (28,5 °C). Les anomalies sont positives dans toutes les régions comparativement à la normale (Planche n° 5b).

1.3. Humidité relative

L'humidité relative de l'air a été importante avec des valeurs maximales relevées à Danyi au cours des trois décades avec respectivement 91, 94 et 94 %. Les minimales sont observées à Anié Mono au cours des deux premières décades (73 et 71 %) et à Tabligbo (78 %) durant la troisième décade (Tableau 1, 2 et 3).

1.4. Vent

L'analyse des données des tableaux n° 1, 2 et 3 montre qu'au cours des trois décades, les vitesses maximales du vent à 2 m du sol ont été enregistrées à Lomé avec respectivement 2,2 ; 2,6 et 2,6 m/s. Les minimales sont relevées à Tabligbo et à Kouma Konda (0,4 m/s) durant la première et la troisième décade, à Mango (0,3 m/s) pour le compte de la deuxième décade.

2. SITUATION AGROMETEOROLOGIQUE

Dans les régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale, les producteurs ont effectué principalement des travaux d'entretien des cultures (le sarclage, le buttage et les traitements phytosanitaires). Les récoltes (maïs, igname, sorgho précoce et arachide) se poursuivent. Toutefois, certaines cultures (voandzou, niébé, soja, riz...) sont en plein développement. Les fortes pluies observées au cours des deux dernières décades ont provoqué des inondations par endroits, entraînant la destruction et la perte de certaines cultures.

Dans les régions Maritime et des Plateaux, les préparatifs du sol pour la petite saison agricole se poursuivent, avec des semis ponctuels de maïs, d'arachide, du niébé et du riz. Cependant, l'irrégularité des pluies a entraîné des séquences sèches localisées (surtout dans l'extrême-sud de la Maritime) et des inondations par endroits dans les Plateaux-Est, affectant certains semis précoces. Dans les régions des Savanes, de la Kara et de la Centrale, les producteurs ont effectué principalement des travaux d'entretien des cultures (le sarclage, le buttage et les traitements phytosanitaires). Les récoltes (maïs, igname, sorgho précoce et arachide) se poursuivent. Toutefois, certaines cultures (voandzou, niébé, soja, riz...) sont en plein développement. Les fortes pluies observées au cours des deux dernières décades ont provoqué des inondations par endroits, entraînant la destruction et la perte de certaines cultures.

Dans les régions Maritime et des Plateaux, les préparatifs du sol pour la petite saison agricole se poursuivent, avec des semis ponctuels de maïs, d'arachide, du niébé et du riz. Cependant, l'irrégularité des pluies a entraîné des séquences sèches localisées (surtout dans l'extrême-sud de la Maritime) et des inondations par endroits dans les Plateaux-Est, affectant certains semis précoces.

3. PERSPECTIVES

Le mois d'octobre sera marqué par des pluies faibles à modérées dans le Nord et modérées dans la zone Sud. La poursuite de l'entretien des cultures constituera la principale activité des producteurs dans la zone bimodale. Les activités de récolte et de stockage d'une part, de séchage, de défrichage et de buttage d'autre part vont préoccuper ceux de la zone monomodale.

CONCLUSION

Au cours du mois de septembre, l'ensemble du pays a été arrosé par des pluies avec des cumuls plus ou moins importants excepté la Maritime. Cette pluviométrie a chargé le sol permettant aux cultures en pleine croissance de satisfaire leur besoin en eau. Les températures sont en hausse par rapport à la normale. Les autres paramètres climatiques tels que le vent et l'humidité relative de l'air ont été globalement favorables pour les cultures.

EQUIPE SCIENTIFIQUE :

Dr. ISSAOU Latifou, Directeur Général;
M. AGNIGA K.Tchaa, Chef division agrométéorologie;
M. KPABEBA Laoukossima, Ingénieur en Agrométéorologie ;
M. BOUKARI Razakou, Agrométéorologue..

Production: Agence Nationale de la Météorologie ,
Infographie: Atlantic Fox Group, (+228) 98346390/91267138