RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

BULLETIN DECADAIRE D'INFORMATION AGRO-HYDRO-METEOROLOGIQUE DU GTP

ANAMET

2024, N° 005

23 mai 2024

« Créer de la valeur ajoutée dans les filières prioritaires du projet pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable au Togo»

FSRP
West Africa Food System Resilience Program
Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest

Dans ce numéro :

Situation météorologique 1

Situation hydrologique 2

Situation agricole 2 - 3

Situation du couvert végétal 4

Faits saillants

- Bonne pluviométrie sur la majeure partie du pays ;
- Disponibilité des engrais dans les magasins de la CAGIA, 111 596,300 tonnes d'engrais disponibles ;
- Pêche chalutière, Etat océanique agité ;
- Hausse saisonnière des prix du maïs sur les marchés ;
- Spots sur les semences sur la TVT ;
- Focus sur quelques variétés d'arachide ;
- Dégradation du couvert végétal.

1. SITUATION MÉTÉOROLOGIQUE

1.1. SITUATION PLUVIOMÉTRIQUE: PLUIES MODEREES À FORTES

Durant la deuxième décade du mois de mai, des activités pluvio-orageuses ont été observées sur toute l'étendue du territoire. Des pluies modérées à fortes ont été enregistrées. Les zones les plus arrosées sont situées dans les régions des Savanes et Maritime. Les cumuls pluviométriques ont varié de 9,2 mm (Kanté) en deux (2) jours à 119,6 mm (Mango) en six (6) jours.

Par rapport à la normale 1991-2020, la pluviométrie a été excédentaire sur l'ensemble du pays à l'exception de l'extrême nord-ouest des Savanes, le sud-ouest de la Centrale et le nord-ouest des Plateaux où la situation est déficitaire.

Perspectives: la prochaine décade sera marquée par des activités pluvio-orageuses sur la majeure partie du pays.



Figure 1 : Carte des cumuls de la décade

1.2. SITUATION AGROMÉTÉOROLOGIQUE

Les conditions météorologiques de la décade ont été propices aux activités agricoles.

Dans la zone Nord, la préparation des parcelles continue avec les labours pour les semis. Les premières pluies utiles dans la région des Savanes ont permis le semis du sorgho de trois (03) mois et du coton.

Au Sud, les labours se poursuivent parallèlement aux semis de maïs, arachide, patate douce, niébé, ainsi qu'à la mise en place des boutures de manioc. On note aussi par endroit le traitement phytosanitaire des cultures et l'épandage d'engrais. Dans certaines préfectures le maïs est en phase de floraison.

Perspectives: il est prévu un démarrage tardif à tendance normale de la saison dans toute la zone monomodale, sauf dans le nord de la région de la Kara et le sud des Savanes où la saison aura un début précoce à tendance normale.

Début de saison tardif = début de saison après le début normal

Début normal = début qui arrive d'habitude, qui sert de référence, qui est fréquent, la moyenne sur 30 ans

AVIS ET CONSEILS 1 :

Dans le nord du pays, il est conseillé de poursuivre la préparation des parcelles et de s'approvisionner en semences certifiées pour les semailles.

Pour la zone bimodale (sud Togo) il est recommandé de :

- choisir des variétés à cycle court tolérantes au stress hydrique et à haut rendement ;
- s'approvisionner en semences et en engrais de qualité suffisamment disponibles dans les magasins de la CAGIA et des structures agrées ;
- utiliser les produits phytosanitaires homologués pour le traitement des cultures ;
- prévenir l'occupation anarchique des zones inondables ;
- veiller à la gestion rationnelle des ressources en eau pour assurer des aménagements hydro-agricoles ;
- suivre au quotidien les prévisions de l'ANAMET.

Ce bulletin décadaire du groupe de travail pluridisciplinaire est produit avec l'appui technique et financier du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, projet Togo (PRSA-TOGO)

2. SITUATION HYDROLOGIQUE

Dans cette deuxième décade du mois de mai, les **écoulements** n'ont pas connu d'évolution majeure dans les bassins. Les hauteurs moyennes et maximales qui sont respectivement de **97,55 cm** et **108 cm** ont connu une légère diminution par rapport à la première décade.

Tableau 1: **Hauteurs d'eaux moyennes et maximales**

Stations	Hauteur Maximale (cm)	Hauteur Moyenne (cm)
KPEDJI (Zio)	108	97,55
MANGO (Oti)	64	47,11
KOLOKOPE (Mono)	108	76



Figure 2 : Courbes de variation des hauteurs d'eau

Source: DRE, mai 2024

3. SITUATION AGRICOLE

3.1 PRODUCTION VEGETALE

Pour la campagne agricole 2024-2025, les engrais vivriers et les semences agricoles sont toujours disponibles.

A la date du 23 mai 2024, le stock physique national des engrais minéraux disponibles est de **111 596,300 tonnes** dont **44 041,600 tonnes** de NPK et **67 554,700 tonnes** d'UREE (*Fig 3*).



Figure 3 : Stock d'engrais disponible au 23/05/2024

3.2 PROTECTION DES CULTURES

Lutte Biologique Contre La Chenille Légionnaire D'automne (*Spodoptera frugiperda*)

Dans le cadre de la lutte biologique contre la chenille légionnaire d'automne, la Direction de la protection des végétaux (DPV) a procédé le 18 mai au lâcher de deux parasitoïdes (Image 1). L'espèce *Cotesia marginiventris* (Image 2) qui parasite les larves a été lâché à Kpomé dans la préfecture de Vo, et *Chelonus insularis* (Image 3) qui parasite les œufs a été lâché à Bolou dans la préfecture de Zio.

Afin de permettre un bon établissement (dissémination rapide) de ces parasitoïdes, il est recommandé aux producteurs des localités environnantes de ne pas utiliser les insecticides.

Image 1 : Opération de lâcher à Kpomé

Image 2 : *Cotesia marginiventris*

Image 3 : *Chelonus insularis*

3.3 UTILISATION DES SEMENCES AMELIOREES

Pour accroître les rendements des cultures, il est important d'utiliser les semences améliorées. Dans ce cadre, la Direction des semences agricoles et plants (DSP) organise des séances d'informations et de sensibilisations sur les médias (chaînes de radios et de télévisions).

Le calendrier de passage du spot vidéo sur la TVT est présenté dans le tableau 2.

Suivez les spots vidéos sur la TVT

Tableau 2 : Calendrier de passage du spot vidéo sur la TVT

CALENDRIER DE PASSAGE DU SPOT VIDEO

N°	Jours de passage	SPOT PUBLICITAIRE			Observations
		Français	Kabyè	Ewe	
13	Samedi 25/05/2024	X			Après le journal de 20 h
14	Lundi 27/05/2024		X	X	Avant le journal en langue nationale de 18 h
15	Mercredi 29/05/2024	X			Avant le journal de 13 h
16	Vendredi 31/05/2024		X	X	Avant le journal en langue nationale de 18 h
17	lundi, 03/06/2024		X	X	Avant le journal en langue nationale de 18 h
18	Mercredi, 05/06/2024	X			Avant le journal de 13 h

Ce bulletin décadaire du groupe de travail pluridisciplinaire est produit avec l'appui technique et financier du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, projet Togo (PRSA-TOGO)

Les prix officiels des semences améliorées sont présentés dans le tableau 3

Tableau 3 : Prix des semences au kilogramme

CULTURES	PRIX AU KG (F CFA)
Maïs	625
Riz	525
Sorgho	800
Fonio	600
Sésame	2 500
Niébé	850
Soja	700
Arachide en gousse	800

3.4 PRODUCTION HALIEUTIQUE

Pour cette décade la production halieutique se résume à la pêche chalutière qui est de **3,044 tonnes** correspondant au débarquement de deux (02) chalutiers. Par contre il n'y a pas eu de récolte dans les fermes piscicoles.

Tableau 4 : Données de production chalutière et piscicole du 13 au 19 Mai 2024

Période	13 au 19 Mai 2024
Pêche chalutière (tonne)	**3,044***
Production Tilapia (tonne)	**0**

* Nombre de navires ayant débarqué : 02 ***Source:*** *DPA, Mai 2024*

AVIS ET CONSEILS 3 :

Dans la perspective de renouvellement du stock halieutique national et d'une cogestion efficace entre les usagers des différents plans d'eaux, il est rappelé à tous les acteurs de la filière de respecter la réglementation en vigueur et éviter d'utiliser les engins de pêche prohibés destructeurs de ressources.

Aussi il est rappelé à tous les acteurs de la pêche artisanale maritime que l'état océanique prévu pour les 23, 24 et 25 mai est agité (niveau 2). Il est rappelé à toute la communauté de la pêche artisanale maritime de respecter les drapeaux d'annonciation des prévisions de l'état de l'océan avant toute sortie en mer.

Pour rappel le rouge interdit toute sortie, le jaune la prudence et le vert l'autorisation mais néanmoins tous les usagers marins de la pêche doivent être prudents et prendre des mesures idoines de sécurité et se munir tous de leurs gilets de sauvetages avant toute sortie en mer.

Aussi les pêcheurs du port de pêche sont tenus de déclarer tous les membres d'équipages aussi bien à la sortie qu'au retour de leur campagne de pêche aux gardes côtes présents à quai.

3.5 RELEVES DE PRIX MOYENS MENSUELS DES PRODUITS AGRICOLES DU MOIS D'AVRIL 2024

PRODUITS	REGIONS					Moyenne nationale
	Maritime	Plateaux	Centrale	Kara	Savanes	
ARACHIDE GROSSE GRAINE DECORTIQUE	956	869	863	851	729	853
ARACHIDE PETITE GRAINE DECROTIQUE	939	788	966	814	737	849
COSSETTE DE MANIOC	368	207	200	175	781	346
FONIO	1481	1253	1481	1710	1481	1481
GARI	346	346	331	381	426	366
GOMBO SEC	2500	2379	1532	700	550	1532
GOUSSI DECORTIQUE	2546	2748	2150	2558	1917	2384
GOUSSI NON DECORTIQUE	1308	1151	1239	1265	1115	1216
HARICOT BLANC	667	585	632	639	545	614
HARICOT ROUGE	582	526	517	934	500	612
MAIS BLANC	332	277	273	275	251	282
MAIS JAUNE	327	291	263	265	247	279
MIL	483	487	466	350	329	423
PIMENT ROUGE SEC	2000	2104	2000	450	1014	1514
RIZ DECORTIQUE LOCAL	525	475	434	460	376	454
RIZ ETUVE	395	402	375	442	345	392
RIZ PADDY	258	200	203	228	211	220
SESAME	1437	1437	1437	2040	900	1450
SOJA	394	344	298	300	323	332
SORGHO BLANC	358	377	335	315	277	332
SORGHO ROUGE	458	348	325	315	274	344
TAPIOCA	603	662	560	574	831	646
TOMATE FRAICHE	587	528	587	433	800	587
VOANDZOU	763	1071	679	560	641	743

Source : DSID, SIMa avril 2024

Ce bulletin décadaire du groupe de travail pluridisciplinaire est produit avec l'appui technique et financier du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, projet Togo (PRSA-TOGO)

3.6 FOCUS SUR QUELQUES VARIETES D'ARACHIDE ET LEURS CARACTERISTIQUES

N°	DENOMINATION	OBTENTEUR	MAINTENEUR	PORT DU PLANT	TYPE DE FLORAISON	COULEUR DES GRAINES	CYCLE SEMIS-MATURITE 95% (JOURS)	POIDS DE 100 GRAINES (G)	RENDEMENT POTENTIEL EN GRAINES (T/HA)	DORMANCE DES GRAINES	VOCATION D'UTILISATION	AUTRES CARACTERES
1	RAFEET	CERAAS	ITRA	Erigé	Séquentiel	Rose claire	95	50	2,5	Dormante	Huilerie et confiserie	Teneur en huile 42%
2	024 (ICGV 86024)	ICRISAT	ITRA	Semi érigé	Séquentiel	Rose	95 -100	38	2,5	Dormante	Huilerie et confiserie	Teneur en huile 43%
3	SH (SH 470P)	INERA	ITRA	Erigé	Séquentiel	Rose claire	90	45	1,5-2	Dormante	Arachide de bouche et confiserie	Teneur en huile 39%
4	AMI-ZI (ICGV-IS13825)	ICRISAT	ITRA	Erigé	Séquentiel	Rouge clair	95-100	45	2.5	Dormante	Huilerie	Teneur en huile 51%
5	RMP 12	IRHO	ITRA	Semi érigé	Séquentiel	Bicolore tigré	110-120	92	3	Non dormante	Confiserie	Tolérante à la rosette
6	TS 32-1	IRHO	ITRA	Erigé	Séquentiel	Rose	90-100	50-55	2	Non dormante	Huilerie	Moyennement sensible à la cercosporiose
7	ICG (ICGV 01276)	ICRISAT	ITRA	Semi érigé	Séquentiel	Rose foncé	115-120	58-64	3	Dormante	Confiserie	Tolérante à la rosette
8	ICIAR (ICIAR 19 BT)	ICRISAT	ITRA	Erigé	Séquentiel	Rose	90 -100	53-58	3	Non dormante	Huilerie	Moyennement sensible à la cercosporiose

Source : MAEDR, 2024

4. SITUATION DU COUVERT VEGETAL (IMAGE SATELLITAIRE)

L'Indice des conditions de végétation (VCI – Vegetation Condition Index) évalue l'état de santé de la végétation par rapport aux tendances historiques. Il varie de -1 (mauvaise condition de la végétation) à 1 (bonne condition de la végétation). Le VCI rapporte l'indice NDVI de la décade courante à son minimum et son maximum à long terme, normalisé au moyen des valeurs historiques du NDVI pour la même décade.



Figure 4 : Indice des conditions de végétation (VCI)

La décade a été caractérisée par une légère amélioration de la situation végétale par rapport à la décade passée. Ainsi on note une bonne santé de végétation au Nord-Est des Savanes , dans la vallée de l'Oti, une partie de la région de la Kara, l'Est de la région des Plateaux et le Sud de la Maritime. Cependant toute la région Centrale a connu une mauvaise condition végétale au cour de cette décade (a).

Comparé à la même décade de l'année passée (b), on note une dégradation du couvert végétal dans presque toutes les régions au cours de cette deuxième décade de mai 2024.

Source : Système mondial d'information et d'alerte rapide (SMIAR)

Ce bulletin décadaire du groupe de travail pluridisciplinaire est produit avec l'appui technique et financier du Programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, projet Togo (PRSA-TOGO)